

ସଂକ୍ଷେପରେ

ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ ଖସି ୨୩ ମୁତ



ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ ଖସି ୨୩ ମୁତ... ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ ଖସି ୨୩ ମୁତ... ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ ଖସି ୨୩ ମୁତ...

ବିନା ଟିକାରେ ପ୍ଲାଉଟ୍ ଉଡ଼ାଇବୁନି

ପ୍ଲାଉଟ୍ ଉଡ଼ାଇବୁନି... ବିନା ଟିକାରେ ପ୍ଲାଉଟ୍ ଉଡ଼ାଇବୁନି... ବିନା ଟିକାରେ ପ୍ଲାଉଟ୍ ଉଡ଼ାଇବୁନି...

ଭୂତାଣୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉତ୍ତୀର ଭୟ



ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨ କୋଟି ପାର



ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨ କୋଟି ପାର... ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨ କୋଟି ପାର...

ସାତକ କୋଭିଡ୍-୧୯ ଭୂତାଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାରେ... ସାତକ କୋଭିଡ୍-୧୯ ଭୂତାଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାରେ...

ଭାରତକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି... ଭାରତକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି... ଭାରତକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି...



ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ... ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ...

ଈତିର ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି... ଈତିର ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି...

ଏନ୍୪୪୦କେ ଭାରିଆଣ୍ଡ ୧୫ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରାଣହୀନ

ଏନ୍୪୪୦କେ ଭାରିଆଣ୍ଡ ୧୫ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରାଣହୀନ... ଏନ୍୪୪୦କେ ଭାରିଆଣ୍ଡ ୧୫ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରାଣହୀନ...

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ଦେଇ କମାଇବାକୁ ବାଧ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୪୫%

୧୫% ଟି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ



ମହାମାରୀ ଯୋଗୁ ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ... ମହାମାରୀ ଯୋଗୁ ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ...

ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ/ଡିଜେଲ... ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ/ଡିଜେଲ...

ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି... ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି...

ହଟିଲା କଙ୍ଗନାଙ୍କ ରୁଇଟର ଆକାଉଣ୍ଟ

ମମତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ



ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୪୫: ଚିନ୍ତୟି ସୁପ୍ରିମୋ... ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୪୫: ଚିନ୍ତୟି ସୁପ୍ରିମୋ...

ରୁଇଟର କହିଥିଲେ... ରୁଇଟର କହିଥିଲେ...

ବ୍ରିଟେନରୁ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୪୫: ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ... ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୪୫: ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ...

'ଭାଜପାକୁ ରାଜନୈତିକ ଅମୂଳ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ'

କୋଲକାତା, ୪୫



ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜନସାଧାରଣ ଭାଜପାକୁ... ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜନସାଧାରଣ ଭାଜପାକୁ...

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ... କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ...

'କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ ମୁତୟନ ହେଉ'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୪୫: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ... ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୪୫: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ...

ହିନ୍ଦୀକୁ ନେଇ ଉଦ୍‌ବେଗ ଜଣାଇଲେ ମୋଦି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୪୫

ସିଦ୍ଧିଆଇ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ



ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ... ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ...

ଭାଜପା ନେତା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ... ଭାଜପା ନେତା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ...

ଅଂଶୁଘାତ: ଏବେଠୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସତର୍କ



ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ସତର୍କ ଓ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରଚୁର ଅଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଗୁହାଳକୁ ଅଣ୍ଡା ରଖିବା ସହିତ ସକଳ ଜାତୀୟ ଗାଈ ଓ ମଇଁଷିକୁ ଦିନରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଖାଦ୍ୟରେ ୩୦ ଗ୍ରାମ୍ ଖଣିଜ ଲବଣ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଦିନ ୧୦ଟା ପରେ ଗୋଷୁକୁ ବାହାରକୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଜୁନ ମାସରେ ବର୍ଷା ଆସିବାର ଓ ବର୍ଷାରତ୍ନରେ ସାହାଣ ଓ ବଜବଳିଆ ରୋଗ ଅଧିକ ହୁଏ । ତେଣୁ ବର୍ଷାରତ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ମାସରେ ସମସ୍ତ ଗାଈ, ବକସ ଓ ମଇଁଷିକୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସାହାଣ, ବଜବଳିଆ ଓ ଫାଟୁଆ ରୋଗର ଚିକା ଦିଅନ୍ତୁ । ଦାନାକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।

ଏହି ସମୟରେ ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟାକୁ ଅଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ରଖନ୍ତୁ । ଦିନ ୧୦ଟା ପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଚରିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ପି.ପି.ଆର୍. ଚିକା, ଏଣ୍ଟାବୋଟକ୍ସେନିଆ ଓ ଛେଳି ବସନ୍ତ ଚିକା ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୫ ରୁ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଖଣିଜ ଲବଣ ମିଶ୍ରଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟାମାନେ ଦିନସାରା ଚରିଲେ ମଧ୍ୟ ମେ ମାସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଘାସ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରତି ଛେଳି ବା ମେଣ୍ଟାକୁ ଓଜନ ହିସାବରେ ଏହି ମାସରେ ଦିନକୁ ୧୦୦ରୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅଦା-ହଳଦୀ ଲଗାଇଲୁଲେ...



ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ଓ ହଳଦୀ ଲଗାଇବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ । ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଦା ଓ ହଳଦୀ ଲଗାନ୍ତୁ । ଅନୁମୋଦିତ ଅଦା କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ସୁରଭି, ସୁରୁତି, ସୁପ୍ରଭା । ଅଦା ଗାଞ୍ଜ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୫ରୁ ୧୭ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ । ଅନୁମୋଦିତ ହଳଦୀ କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ରଙ୍ଗ, ସୁରମା, ରୋମା, ରଞ୍ଜି । ହଳଦୀ ଗାଞ୍ଜ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୦ରୁ ୨୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ବିହନ ଦରକାର । ଏକ ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଓ ୩୦ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚର ପଟାଳି କରାଯାଏ । ଭୁଲ ପଟାଳି ମଝିରେ ୩୦ ସେ.ମି. ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉଚ୍ଚ ପଟାଳି ଯୋଗୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ । ଅତିକମ୍ପରେ ଲଗାଇବାର ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖରାପଡ଼ିବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ପଟାଳି ଉପରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୨୫ ସେ.ମି. ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୫ରୁ ୨୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ । ୫ ସେ.ମି. ଗଭୀର ସିଆରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଖତ ଓ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ । ଶୁଖିଲା ପାଳ ବା ନଡ଼ା ବା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପଟାଳିକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ (ମଲ୍ଚିଙ୍ଗ) କରି ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଅଦା ଲଗାଇବା ବେଳେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ସାର ଆବଶ୍ୟକ । ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ବେଳେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ୬୦ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅନ୍ତରେ...

ଖରାଦିନିଆ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା ମକା ଓ ବାଜରା ଏବଂ ତାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ବରଗୁଡ଼ି ଓ ତଜାର ରାଣୀ ଗାଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ । ସବୁଦିନିଆ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ଯଥା ସକଳ ନେପିଆର ବାଜରା ଓ ଗିନି ଘାସରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୬ କିଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।



କୃତ୍ରିମ ନାଲି ଖାତା ହେଉଥିଲେ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ଫ୍ୟୁରାସଲକୁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଏ ମାସର କୃଷି ସୂଚନା

ଖରିଫ ଫସଲ ଯୋଜନା



ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ନିଜ ଜମିର ପ୍ରକାର, ମାଟିର ଉର୍ବରତା, ସେଚନକର ସୁବିଧା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଫସଲ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ସର୍ବନା ପ୍ରାମାଣିକ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା ପ୍ରତି ଡିନ ବର୍ଷରେ ବିହନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଉନତମାନର ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅମଳ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଘରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଡାଲୁଅ ଧାନ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ

ଡାଲୁଅ ଧାନର ଶତକଡ଼ା ୮୦ରୁ ୮୫ ଭାଗ କେଣ୍ଡା ପାଚିଯାଇଥିଲେ ଧାନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାନ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିଲରେ ଥିବା ମିଶା ଧାନ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାନ କାଟିବାର ୬ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିଆରିକୁ ପାଣି ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାନ ଅମଳ ପରେ ୩-୪ଟି ଗଣ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ । ଜମିର କିସମ ଅନୁସାରେ ଖରିଫ୍ ଧାନ ଗାଞ୍ଜ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ । କଟା ହୋଇ ନ ଥିବା ଡାଲୁଅ ଧାନରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟିଆ ରୁଣ୍ଡି ବା ଚକଡ଼ା ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ଷେତରୁ ପାଣି କାଟି ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ୬ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ କରି ଧାନ ଗଛକୁ ଦୁଇପଟକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ପାଖି କାଟନ୍ତୁ । ଗଛ ମୂଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଫ୍ୟୁନିକାମିଡ୍ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ବାଇଗୋଟେମ୍ପୁରାନ୍ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ପାଇମେଟ୍ରୋଲିନ୍ ୩୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପଦନ ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ । ସବୁଜିତ ଦାନା ତଥା ନିର୍ମଳ ଅଣ୍ଡା ପାଣି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଦିନକୁ ୨ରୁ ୩ ଥର ପାଣି ବଦଳାନ୍ତୁ । ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ଘର ଜାଲିରେ ଓଦାଅଣା ଗାଣନ୍ତୁ । ଭୁଲ ପଦନ ଯିବା ଆସିବାର ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ।

ଖରାଦିଆ ପନିପରିବା ଗାଞ୍ଜରେ ଜଳସେଚନ : ଖରାଦିଆ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଜଳସେଚନ ଓ ରୋଗପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶାଗ ଫସଲକୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ଜିଆଖତ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଟିର ବତର ଅନୁସାରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ତରଭୁଜ ଅମଳ ପରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲେ ସେହି ଜମିରେ ଶାଗ, ପୋଇ, ବାଇଗଣ, ଗୁଆଁର, ଲଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ଗାଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷା ଦିନରେ ବାଇଗଣ ଓ ଲଙ୍କାଗାଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାଚା ପକାନ୍ତୁ । ବାଇଗଣ ଓ ଲଙ୍କା ଚାଚାରେ ତରଳୁ ମିଶ୍ରିତ ଔଷଧ ଦ୍ରବଣରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ବିଶୋଧନ କରି ଲଗାନ୍ତୁ (ମିଶ୍ରିତ ଔଷଧ ଦ୍ରବଣରେ ଷ୍ଟେସ୍ଵୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ କାର୍ବେଣ୍ଡାଲିମ୍ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇବେ) । କଲରା, କହ୍ନି, ପୋଟଳ, ଲାଉ ଫସଲରେ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ଦେଖାଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।



ଗାଞ୍ଜ ପାଇଁ...

ରାଶି ଫସଲରେ ପତ୍ର ବିକ୍ଷା ପୋକ ଲାଗିଲେ: ରାଶି ଫସଲରେ ଫୁଲ ଧରିବା ଓ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଓ ଫଳବିକ୍ଷା ପୋକ ଲାଗିଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ପ୍ରୋପେନୋଫସ୍ କିମ୍ବା ୨ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ୨୦ ଇ.ସି. ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଚଳପତ୍ରଠାରୁ ଉପରକୁ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଆସିଲେ ବା ଫଳ ଶୁଖି ଆସିଲେ ରାଶି ଅମଳ କରନ୍ତୁ । ତିନାବାଦାମ : ତିନାବାଦାମ ଫସଲ ପାକଳ ହୋଇ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ ଦେଇ ଅମଳ କରନ୍ତୁ । ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀରେ କଳଙ୍କ ରୋଗ ଦମନ: କଳଙ୍କରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ୍ ମାକୋଜେବ୍/ଚେରୁକୋନାଜୋଲ୍ ୧ ମି.ଲି. ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସାୟନିକ ସିଞ୍ଚନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ । ଫୁଲଶୁଖା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ୍ କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍/ଆୟୋଫ୍ୟାନେଟ୍ ମିଆଇଲ୍ ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ଅଣଧାନ ଗାଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ...

ଧାନ ବଦଳରେ ଅଣଧାନ ଫସଲ ଯଥା ମକା-ବରଗୁଡ଼ି,ହରଡ଼,ବିରି,ମାଞ୍ଜିଆ, ତିନାବାଦାମ,ଜଡ଼ା ଓ କନ୍ଦମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଗାଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ । ମରୁଡ଼ି ସହଣି ଥିବା ଗଭୀର ତେର, ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି କିସମ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତୁ । ଫସଲର ସକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ । ଗଭୀରତା ଜମିରେ ଗଭୀର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଛୁଡ଼ା ଓ ନାଳ ଅବକବଦଳରେ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାଣି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇରହିବ । ଖରାଦିଆ ଗାଞ୍ଜ ନିର୍ମୂଳ ଭାବେ କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗପୋକ ଓ ଘାସ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଫସଲ



ଶୀଘ୍ର ବୁଣା ଯାଇପାରିବ । ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ବୁନ, କାଗଜକଳ ମଇଳା ଇତ୍ୟାଦି ମୂଲିକା ସଂଶୋଧନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଫଳତଃ ଜମିରେ ଘାସ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକ ଜଳ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଓ ଅମଳ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏକକ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଶ୍ରିତ ବା ଅନ୍ତଃଫସଲ ଗାଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ । ଡିପ୍ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଧାନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଯଥା-ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼, ମାଞ୍ଜିଆ, ମକା ଆଦି ଫସଲ ଅନ୍ତଃଫସଲ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇପାରେ । ବୁଣିବାବେଳେ ନାଲିରେ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମରୁଡ଼ି ସହି ପାରୁଥିବା ଧାନ କିସମ ଯଥା-ଅନୁବା, ପଥରା, ଯୋଗେଶ, ଖଣ୍ଡଗିରି, କଳଙ୍କ-୩, ହାରା, ବନ୍ଦନା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

-କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ସଂପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର

