

ଡାଲିଜାଟେୟ ଫ୍ରସଲରେ ସାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ



କ କି.ଗ୍ରା. ଡାଲିଜାଟାୟ ବିହନ ପିଛା କାର୍ବୋକ୍ସିନ ୫୩.୪% x ଥରାମ
୩୩.୪% ମିଶ୍ରିତ ଡି.ୱେ. ପିଣ୍ଡିଆଶକ ଆଷଧ ୨ ଗ୍ରାମ ଗୋଲାଇ
ବିହନ ବୁଣ୍ଡୁ । ହେଲ୍କର ପ୍ରତି ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ବିହନରେ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ
ରାଇଜୋବିଯମ୍ ବୀଜାଶୁ କଳଚର ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ବିହନକୁ ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣ୍ଡୁ
ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୩୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ । ଜମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ
କରି ହେଲ୍କର ପିଛା ୧୦/୧୭ ଶରତ୍ତ ଶତା ଗୋବର ଖତ ବା କମ୍ପୋସ୍ଟ ପ୍ରଯୋଗ
କରନ୍ତୁ । ମୂର, ବିରି ପାଇଁ ହେଲ୍କର ପ୍ରତି ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୪୦ କି.ଗ୍ରା.
ଫ୍ରେଶ୍ ଓ ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସର୍ବାଂଶ ମନର ପାଇଁ ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ,
୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଫ୍ରେଶ୍ ଓ ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜଉପୋକ
ଲାଗିଲେ ହେଲ୍କର ପିଛା ରୋଗର ୧ ଲିଟର କିମ୍ବା ଜମିଭାଙ୍ଗେପ୍ରିଷ୍ଟ ୧୭.୮
ସେ.ଏଲ୍. ୧୨୦ ମି.ଲି.କ୍ରୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଆଖୁ ୪୫ଦିନର ହୋଇଥିଲେ...



ଶ୍ରୀ ଗନ୍ଧାରାଜଥିବା ଆଖୁ ୪୫ଦିନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ କୋଡ଼ା ଖୁସା କରି ଏକର ପ୍ରତି ୪୦କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରକୁ ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହୃଡା ଚେକି ଦିଆନ୍ତୁ ମୂଳ ଆଖୁ ୩୦ରୁ ୪୫ଦିନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ମଦା ପ୍ରଶାନ୍ତାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଆଖୁ ୩୦ରୁ ୪୫ଦିନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଦା ପିଛା ୧୫ଗ୍ରାମ ମୁରିଆ ଓ ୧୦ଗ୍ରାମ ପଚାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରକୁ ମୁରିଆ ସାର ସ୍ଥାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୁରିଆ ସହିତ ନିୟମିତ୍ତିଆ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ୧୦୦କିଗ୍ରା. ମୁରିଆ ସହିତ ୨୦କି.ଗ୍ରା. ନିୟମିତ୍ତିଆ ମିଶାଇବାକୁ ପଢ଼ିଥାଏ । ରାଶାଯନିକ ଜେଣ୍ଡିକ ସାରକୁ ୪୦୦କି.ଗ୍ରା. ମୁଣ୍ଡ ଗୋବର ଖାତ ସହିତ ମିଶାଇ ଆଖୁ ଲଗାଇବାର ୩୦ଦିନରେ ଥରେ ଏବଂ ୭୦ଦିନରେ ଆଉଥରେ ଆଖୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦିଆନ୍ତୁ

ଚିନାବାଦାମରେ କୋଡ଼ାଖୁସା



ପାଣୀଙ୍କ ଯତ



ଗ୍ରହମରେ କାଳିଶୁଣ୍ଡି ପୋକ ପରିଚାଳନା



ଗ ହମ ଫେଲରେ କାଳିଗୁଡ଼ି ଗୋଟି
ହୋଇଥିଲେ, ଏହାର ଦମନ ସକାଶେ
ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ
କିମ୍ବା ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ଗ୍ରାମ
କାର୍ବେଣ୍ଟାଜିମ୍ ୨୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ। ସଥଳ ଲଗାୟାଇଥିବା ଫେଲରେ ଶସ୍ୟତ୍ୟାଗ
ଗୋଟି ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ
ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦ଗ୍ରାମ ମାଙ୍କୋଜେବେ ୨୦୦ଲିଟର
ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ନ ଥିଲେ ଫେଲରେ
ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ପୁଲ ଓ
କ୍ଷୀର ଦେଖିବା ଅବଶ୍ୟକ ଜଳସେଚନ ପ୍ରତିଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏ ମାସର କ୍ଷେତ୍ର ସୁଚିନ୍ତା

ପ୍ରିଣ୍ଟ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ସାଇତି
ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ୩-୪ ଦିନ ଚାଶଖାରେ
ଶୁଖାଇ ଦେବା ଉଚିତ । ଧାନ ସାଇତିବା
ପୂର୍ବରୁ ଅମାର ଘର ସଫାକରି ସମସ୍ତ ପାଠ
ଓ କଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆନ୍ତୁ । ଅମାର ଘର
କବାଗ ଓ ଝରକାରେ ପାଙ୍କ ଥୁଲେ ବନ୍ଦ
କରିଦିଆନ୍ତୁ । ଅମାର ସଫା କରିବା ପରେ
ଧାନରେ ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ୧୫
କି.ଗ୍ରା । ଧାନ ସହିତ ୪ କି.ଗ୍ରା । ନିମ୍ନ ପିଡ଼ିଆ
ମିଶାଇ ବସ୍ତାରେ ସାଇତି ରଖିନ୍ତୁ । ପୁରୁଣୀ
ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଧାନ ରଖିବା ପୂର୍ବ ଗରମ
ପାଣିରେ ଫୁଲାଳ ଖରାରେ ଶୁଖାଇବା
ଉଚିତ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଢାଙ୍କୁଆ ଧାନ ତଳି
ପ୍ରକୃତି (ୱେଳେ ଚାଷ ପାଇଁ ୧୫



ସାରିକିଷ: ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଜଳପ୍ରେଚନ କରନ୍ତୁ । ଜଳପୋକ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ହେଲ୍କର ପିଛା ୧ ଲିଟର ଗୋଗର କିମ୍ବା ଲମ୍ବିତାଙ୍କୁପ୍ରିଭ୍ୟ ୧୭.୮ ଏସ.ଏଲ୍. ୧୯୦ ମି.ଲି. ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କରଣୀଆ ମାଛି ଲାଗିଲେ ହେଲ୍କର ପିଛା ୧୦୦୦ ମି.ଲି. ଜଳାଳକ୍ଷ କିମ୍ବା ୧୦୦୦ ମି.ଲି. କାର୍ଗ୍ପ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ସୁର୍ମୁଖୀ: ଗୋଟିଏ ଓ ପୋକ ନିରାକରଣ ଆଖ୍ତା : ହିଥରୁ ଆଠ ମାସ ହୋଇଥିଲୁ ବିହନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ହେଲ୍କର ପିଛା ୭୫ ରୁ ୧୦୦ କୁଣ୍ଡଳ ଆଖ୍ତା ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ । ମୂଳିପରୀକ୍ଷା ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖ୍ତାଗୁଣକୁ ଶତକ ୦.୧ ଭାଗ କାର୍ବେଜିମ୍ ୧୨ ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ବୁଢ଼ାଳକେ ଭଲ ଗନ୍ଧ ବାହାର କରିବାକୁ ଧାର୍ତ୍ତି ଧାର୍ତ୍ତି ସଥଳ କିମ୍ବା ୩୦ ସେ.ମୀ.



ଲିଟର ପାଣିରେ ନା ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ । ସଲଫ୍‌ଫେବ୍ର ଏ ଲିଟର ପାଣିରେ
୪ ମାମ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ଆଳୁ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ...

